

Erinevad söötmis- ja pidamisviisid ekstensiivses lambakasvatuses

Lillia Tali
Lambakasvataja
Konsulent



1



2



3

Ekstensiivne loomapidamine

- Pääs õue ja karjamaale
- Looduslikud ja poollooduslikud kooslused
- Enamasti piisavalt maaressurssi
- Liigiomane pidamisviis
- Väiksem sisend – töö, raha, väetised
- PAREM LOOMALE

4



5

Põllumajanduslooma viis vabadust

- .Olla vaba janust ja näljast
- .Olla vaba ebamugavustest
- .Olla vaba valust vigastustest ja haigustest
- .Vabadus loomuomasele käitumisel
- .Olla vaba hirmust ja kannatustest

6



7

Võtmesõnad

- .Sobivad loomad – tõug, vanus, tootmisetapp
- .Tugev immuunsüsteem
- .Hierarhia/loomuomane käitumine
- .Maakasutus – söödaplatsid, karjamaahooldus,
- .rotatsioon
- .Kontakt inimesega - positiivne kogemus
- .ÕIGE SÖÖTMINE**

8



9

Lammas on väga stressitundlik

- Lühiajaline järsk stress – traumad, kiskjarünnakud, transport, keskkonnavaheetus
- Shokk, äkksurm, abort, soolekeerd
- Pikaajaline/krooniline stress – kõhnumine, parasiidiprobleemid, nahaprobleemid, nakkushaigused, nõrgad järglased, piimatus, orf

10



11



12

Hierarhia

- Nõrgemad loomad alati seal, kus tugevamad
- Riskigrupp ei pääse alati söögi ja joogi juurde – söövad saastunud toitu
- Vajadusel eraldan vanusegrupid
- (noored lauta teisele söödale, noored tiined eraldi jne)
- Püsiv stress ei võimalda kosumist ega mõju hästi tiinusele

13

Noorloomad vajavad erikohtlemist



14

Söötmine

- Aeglased üleminekud
- Sööt ei tohi olla liiga kaua ees
- Sööt kaitstud ilmastikutingimuste eest ja aluse peal
- Sööda kvaliteet
- Kaalulisasööta – kas tead täpset kogust?

15



16

Mõju tervisele

- Lambad on seal, kus on sööt, ilmastikust sõltumata
- Noored loomad ei suuda kehatemperatuuri hoida
- Pidevalt kontaktis märja söödaga – nahaprobleemid
- Sõratervis

17



18



19

Konditsioon

- Külmal ajal õues on raskem konditsiooni tõsta
- 70kg kaaluv utt vajab ühe konditsioonipunkti tõstmiseks 8 lisakilo
- Et saavutada see kaheksa nädalaga, peab ta päevas juurde võtma 143 g

20



21

Põhisöödad

•Hein 1-2 kg päevas (vabalt süües rohkem)

•Kuivainesisaldus 84-90%

•Silo 2-3

•Kuivainet 25-40%

•Kuivsilos 40-60%

•Karjamaarohi 6-12 kg päevas

22

Jootmine ja mikroelemendid

•Soojendusega jooturid

•Boolid



23



24

Hügieen

- Söödaplatsi alus väga saastunud
- Võimalusel korralda poegimine mujal kui talv läbi kasutatud söödaplatsil
- Saada kevadel kari talledega õue teisele poole lauta
- Korista suvel söödaplatsid ja ära lase loomi ühele ja samale kohale
- Eriti ohus talled ja noorloomad
- Eimerioos, ümaruss

25

Sorteerimine – mugav nii loomale kui inimesele



26

Tänan kuulamast ja soovin edu.

